

Exposición de Dientes Impactados

En algunas ocasiones, debido a una discrepancia entre el tamaño de la mandíbula y tamaño de los dientes, puede convertirse en un diente afectado o impactado. Normalmente, un **canino superior** es el último diente anterior a entrar en erupción en su lugar y es el segundo diente más comúnmente afectado. Si el diente es afectado aremos los esfuerzos necesarios para guiarlo en su posición correcta en la arcada dental. El tratamiento para esto requiere la eliminación de algunos dientes de leche que bloquean el canino permanente para permitir la erupción espontánea. Sin embargo si no estalla por sí es posible que necesite una remisión a un cirujano oral para exponer el diente con corchetes. Es a discreción del cirujano, ya sea simplemente dejar el diente expuesto o adjuntar una cadena en él para atar al alambre de ortodoncia para traer en oclusión. Puede tomar hasta un año para que el diente llegue en totalidad a oclusión. Si un diente tiene que ser movido largas distancias puede ser necesaria una cirugía de las encías.

Enrojecimiento e hinchazón leve pueden estar presentes en los próximos días después de la exposición de los dientes afectados, esto es normal. Instrucciones postoperatorias:

- Enjuagues de agua tibia con sal
- Aplique una bolsa de hielo 10 minutos de forma intermitente durante el día
- Se recomienda dieta de alimentos blandos
- Medicamento sobre el mostrador para el dolor
- Por favor consulte a su ortodoncista 10-14 días después de la exposición del diente impactado
- No dude en llamar a nuestra oficina con cualquier pregunta / preocupaciones

Firma de Paciente o Tutor Legal

Fecha

Nombre del Paciente