

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS PARA IMPLANTES

(Postoperative Instructions for Implant Placement/ GBR)

- ❖ Tome todas sus medicaciones tal como estén recetadas por su dentista (antibióticos, analgésicos, antiinflamatorio, y Peridex).
- ❖ NO fume durante un mínimo de 14 días. Fumar priva la encía y hueso de oxígeno necesario, afectando el proceso de curación de su implante.
- ❖ EVITE tomar a través de pajitas, tomar bebidas gaseosas, enjuague fuerte, o escupir por 14 días.
- ❖ La hinchazón generalmente llega al punto máximo hasta 72 horas antes de comenzar a resolver. Esto es normal.
- ❖ Aplique continuamente compresas de hielo sobre la zona quirúrgica en el exterior (15 minutos si/ 15 minutos no) para las primeras 24 horas. Muerda SUAVEMENTE y CONTINUAMENTE una gasa durante 20 minutos o hasta que pare el sangrado activo, repita si es necesario (la gasa aparecerá por lo general de color rosa o rojo, lo cual no indica sangrado activo) y rastros de sangre en la saliva hasta por una semana es normal.
- ❖ Intente comer alimentos puré y líquidos inicialmente mientras entumecido, después alimentos más blandos, por dos días. La consistencia de los alimentos que usted coma durante la cicatrización se determina por su tolerancia y cada persona es diferente.
- ❖ Si un diente temporal fue o es colocado en su implante, es crítico que usted NO muerda en este diente o lo utilice para masticar durante las próximas 2 semanas. Recuerde remover este temporal por las noches. El incumplimiento de este causará el fracaso del implante.
- ❖ NO cepille sus dientes por unos días y cepillarse suavemente por 4 semanas. Cepille como de costumbre después de las 4 semanas.
- ❖ En el caso de la carga inmediata del implante, evite masticar en la restauración por 6-8 semanas.
- ❖ Si Suturas / puntos fueron puestos, algunas suturas están diseñadas para disolverse lentamente durante 2-3 semanas, otras serán removidas en la oficina en 2 semanas. Mantenga una dieta SUAVE mientras las suturas están presentes. Por favor NO levante o jale la mejilla o labio para mirar las puntadas.
- ❖ Si usted está tomando control de natalidad, los antibióticos pueden interferir con su eficacia, por favor, se aconseja la utilización de forma alternativa de control de natalidad durante un mes entero.
- ❖ Si problemas inusuales se desarrollan por favor llame a nuestra oficina. Si la oficina está cerrada siga las instrucciones de teléfono y deje un mensaje detallado para su dentista.
- ❖ Es muy importante para el éxito de sus implantes que su higiene oral sea excelente. Cepille su boca y use hilo dental 2 veces al día. Use enjuague antibacterial por lo menos 2 veces al día, favor de ver al dentista para su cita regular de limpieza como se recomendó por su dentista. Es importante que mantenga sus niveles de sarro, placa y cálculo dental a lo mínimo circundante sus implantes.

Firma de Paciente: _____ Fecha: _____